
붙임 1 '24-'25절기 코로나19 예방접종 연장 관련 홍보물



붙임 2 코로나19 감염 예방수칙



붙임 3 코로나바이러스감염증-19 개요

정의	· 코로나바이러스감염증-19(코로나19)
질병분류	· 법정감염병(제4급) · 질병코드: U07.1, U07.2
병원체	· 코로나비리데과(Coronaviridae family)에 속하는 코로나19바이러스(SARS-CoV-2)
병원소	· 유행 초기 중국 우한시장에서 판매하는 동물 또는 박쥐 등으로 추측
전파경로	· 호흡기 비말에 의한 전파 - 기침, 재채기, 말하기 등으로 인한 호흡기 비말 - 밀폐된 공간에서 공기전파(에어로졸) 가능 · 바이러스에 오염된 표면이나 물체를 만진 후 눈, 코, 입을 만지면 감염
잠복기	· 1 ~ 14일(평균 5 ~ 7일)
진단을 위한 검사기준	· 확인진단: 검체(비인두도말, 구인두도말, 가래 등)에서 특이유전자 검출 · 추정진단: 검체(비인두도말, 구인두도말, 가래 등)에서 특이항원 검출
증상	· 발열(37.5℃ 이상), 기침, 호흡곤란, 오한, 근육통, 두통, 인후통, 후각, 미각소실 등 - 피로, 식욕감소, 가래, 소화기증상(오심, 구토, 설사 등), 혼돈, 어지러움 콧물, 코막힘, 객혈, 흉통, 결막염, 피부증상 등
치료	· 자율치료 원칙, 입원치료 필요할 경우 입원가능 · 증상 발현 시 의료기관 방문 등을 통해 진료를 받고, 필요시에 치료제 처방받아 관리 - 60세이상, 기저질환자·면역저하자 고위험군* 대상으로 치료제 처방 * 치료제(베클루리주, 팍스로비드, 라게브리오) 별 투여대상 및 용법·용량이 다르므로, 「코로나바이러스감염증-19 치료제 사용안내」확인 필요
전염기간	· 증상 발생 1~3일 전부터 호흡기 검체에서 바이러스가 검출되고 증상이 나타나는 시기에 바이러스 양이 많아 감염 초기에 쉽게 전파 - 감염 첫주 내에 상부 호흡기 바이러스 양이 최고점에 도달 한 후 점진적으로 감소
치명률	· 전 세계 치명률 약 0.90%[1] · 우리나라 치명률 약 0.10%[2]
관리	<환자관리> · 표준주의, 접촉주의, 비말주의 준수 · 권고격리 기간 동안 스스로 건강관리하고 증상발현 시 신속하게 진료를 통한 조기치료 <접촉자관리> · 감염증상 발생 여부 관찰
예방	· 예방접종 · 일반적 예방 - 올바른 손씻기 · 흐르는 물에 비누로 30초 이상 손씻기 - 기침예절 · 기침이나 재채기 할 때 휴지나 옷소매 위쪽으로 입과 코를 가리고 하기 · 마스크착용 - 씻지 않은 손으로 눈, 코, 입 등을 만지지 않기

1) www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports. '2023.9.1.

2) 주간 확진자 전주 대비 9.4% 감소, 2주 연속 감소 추세. 중앙방역대책본부 보도참고자료. '2023.8.30.