


국내 감염병 동향

■ 칸디다 오리스 감염증, 제4급 법정감염병 신규 지정

- 질병관리청은 칸디다 오리스 감염증을 3월 29일부터 제4급 법정감염병* 및 의료관련감염병**으로 신규 지정, 관리
 - * 유행 여부를 조사하기 위하여 표본감시 활동이 필요한 감염병
 - ** 의료행위를 적용받는 과정에서 발생한 감염병으로서 감시활동이 필요하여 질병관리청장이 고시하는 감염병
- 칸디다 오리스 감염증은 칸디다 오리스 진균에 의한 감염질환이다. 일반적으로 칸디다 오리스는 환자 간 접촉, 오염된 의료기기나 환경, 의료진의 손 등을 통해 전파될 수 있다.
- 특히, 항진균제에 대한 내성이 높고 의료환경에서 장기간 생존이 가능하며, 면역저하자 등을 대상으로 한 침습성 감염의 경우 중증으로 진행되거나 사망에도 이를 수 있어 신속한 진단과 적절한 치료 및 감염관리 조치가 중요하다.



글로벌 *C. auris* 주요 발생 지역(2009~2022)
(Journal of Fungi, 2024)

□ 국가별로 내성 현황 및 유행 유전자형(clade) 차이* 존재

Clade	주요 발생 국가	주요 특성
I (남아시아형)	인도, 파키스탄, 미국, 스페인, 영국 등	전 세계 확산, 다제내성균주가 많음
II (동아시아형)	일본, 한국, 중국, 대만 등	전반적으로 내성 및 전파력 낮음
III (아프리카형)	남아프리카공화국, 동아프리카 등	혈류감염 많음, 내성률 증가 추세, 일부 지역에서 집단 발생 및 유행
IV (남미형)	콜롬비아, 베네수엘라, 멕시코 등	다제내성 보고, 병원 내 전파 위험
V (이란형)	이란	유전적 독립성 크며 내성 패턴 다양, 제한적 지역 보고, 역학적 정보 적음
VI (남아프리카형)	나미비아(24년 첫 보고)	유전적 특성 미상 내성 정보 제한적

* NEJM 종설 논문(*Candida auris* infections, 2024)을 기반으로 주요 clade 특성을 정리함


*자료출처: 질병관리청, 알림·자료, 보도자료(전체), 2026.3.27.

▶ CRE는 2급 법정감염병으로

카바페뎀 항생제에 내성을 가진 장내세균목을 의미함

2021년~2026년 월별 경기도 CRE 신고 통계 (단위: 명)

※ 매해 통계 자료는 변동 가능한 잠정통계입니다.



*자료출처: 감염병포털, 감염병통계

해외 감염병 발생동향

■ 중증열성혈소판감소증후군

- (대만) '26년(3.17)대만에서 약4년 만에 환자(1명)발생 보고

■ 침습성 수막구균 감염증

- (영국) 켄트주에서 지역 내 나이트클럽을 방문한 대학생 중심으로 수막구균 감염증 집단 발생

■ 조류인플루엔자 인체감염증 A(H9N2)형

- (이탈리아) 유럽 내 최초 A(H9N2)형 조류인플루엔자(AI) 인체감염증 1명 발생 보고

■ 랩토스피라증

- (페루) '26년 환자 총 1,045명 발생, 5명 사망 보고

■ 탄저

- (방글라데시) 방글라데시에서 도축된 소 섭취 후 피부 탄저 집단발병 의심사례 발생

■ 샤가스병

- (브라질) 브라질에서 오염된 아사이베리 섭취를 통한 샤가스병 집단 발생 보고

*자료출처: 질병관리청, 2026년 전 세계 감염병 발생 동향 제11호·제12호, 3.26./4.2.

