

잠복결핵감염 관련
자료를 찾아보고 싶다면?



결핵ZERO

결핵제로 tbzero.kdca.go.kr

잠복결핵감염 치료의료기관 및
국가결핵관리정책을 안내하고 있으며,
홍보·교육자료를 제공하고 있습니다.

※ 질병관리청 콜센터 1339 및 가까운
보건소에서도 안내 받으실 수 있습니다.

올바른 기침 예절



결핵 예방과 모두의 건강을 위해
기침, 이렇게 지켜주세요!



기침, 재채기 할 땐
손이 아닌
휴지로 입과 코를
가리고 합니다.




휴지가 없을 시에는
옷소매 위쪽으로
입과 코를
가리고 합니다.



기침, 재채기 후에는
흐르는 물에
30초 이상 비누로
손을 씻어야 합니다.


생활 속 결핵예방 수칙



꾸준한 운동과
균형있는 영양섭취로
건강한 체력 유지



2주 이상
기침·가래가 지속되면
의료기관을
방문해 진료받기



결핵환자와 접촉 시
증상여부와 상관없이
결핵 및 잠복결핵감염
검사 진행



올바른 기침예절
실천하기

잠복결핵 감염 + 바로알기



잠복결핵감염
치료비는 무료!

잠복결핵감염
치료 완료 시
83% 결핵 예방



잠복결핵감염이란? 1



결핵균(Mycobacterium Tuberculosis)에 감염되어 있지만, 몸 속에 들어온 결핵균이 활동하지 않아 결핵으로 발병하지 않은 상태를 의미합니다.


	결핵	잠복결핵감염
증상 유무	2주 이상 기침, 발열, 체중감소 등	증상없음
전염성 유무	기침, 대화를 통해 공기 중으로 전파	전염성 없음
환자 여부	환자	환자 아님
치료 필요성	반드시 치료 필요	치료 권고
검사 방법	흉부X선 검사, 객담검사	면역학적 검사 (TST, IGRA)*

*투베르쿨린 피부반응검사(TST), 인터페론감마 분비검사(IGRA)

잠복결핵감염의 10%는 활동성 결핵으로 발병 가능 2



우리나라는 OECD 국가 중 결핵 발생률 1위 하루 평균 63명의 결핵환자 발생



결핵균 감염 시 총 10%정도에서 결핵으로 발병
일반적으로 결핵균에 감염되면 2년 이내에 약 5%가 결핵으로 발병하고, 그 이후 평생에 걸쳐 약 5% 더 발병하여 총 10%정도에서 결핵으로 발병

잠복결핵감염 치료를 완료하면 83% 결핵 예방 3



잠복결핵감염 양성자가 치료를 받을 경우 치료를 받지 않는 경우에 비해 활동성 결핵 발생률을 약 83% 낮출 수 있습니다.

잠복결핵감염이라면 무료로 치료하기

* 부작용 등을 고려하여 의사 상담에 따라 세 가지 요법 중 한 가지 선택

9개월
이소니아지드

4개월
리팜핀

3개월
이소니아지드 + 리팜핀

잠복결핵감염 치료비는 무료! 4



잠복결핵감염 치료비는 무료이며, 보건소 또는 가까운 의료기관에서 치료를 받을 수 있습니다.

잠복결핵감염 치료비는

산정특례(건강보험가입자) 및 의료급여기금 (의료급여수급권자)에서 본인부담금 전액 면제
※ 단, 비급여, 100분의100 본인부담금, 예비(선별)급여, 상급병실료(2~3인실) 및 본인부담률이 별도로 정해진 항목은 제외

