



1 일반 정보

> 정의 차가운 냉동조건에서 장기간 생존하며 식재료 사용의 주의가 필요한 바이러스로 감염 될 시 위,장관염을 일으키는 **제4급 전염병** 바이러스

2 감염 경로 및 주요원인

> 감염 경로

노로바이러스에 감염된 물 및 음식 등의 경구 섭취

> 주요 원인

오염된 물, 음식, 어패류
감염된 사람이 만든 음식, 구토, 분변 등

3 주요 증상

 잠복기: 12~48시간



설사



구토/복통



발열



근육통

4 예방법



손 씻기와
개인 위생 생활화



끓인 물 마시기
(100℃, 5분 이상)



음식 익혀 먹기
(85℃, 1분 이상)



조리기구 세척, 소독하기

열탕: 조리기구 세척 한 후 열탕소독
100℃, 5분 이상

염소소독: 조리대, 계수대 등 중성세제로
세척 후 200배 희석한
염소소독제(락스 등)로 소독



주변 환경 청결
식중독 환자 발생 시 집단 시설은
환자의 구토, 분변을 안전하게 처리
50배 희석한 염소소독제로
(락스 등)소독하기



집단시설 환자가 발생하면 가까운 보건소에 신고 하세요.(7일 이내)