


응급상황 대응 지침

I. 응급상황발생시

1. 응급처치와 동시에 의료팀에게 신속한 연락을 할 것



2. 협약병원에 환자정보제공
3. 협약병원에 응급구호 및 구급차요청
4. 협약병원 응급 구호팀의 협조 하에 응급가료
5. 구급차량으로 후송 조치 후 행정적 지원

II. 응급상황의 대처요령

1. 의식저하 및 호흡 곤란시 기도를 유지하면서 흡인이 가능한 장소로 신속히 이동
2. 골절시 어르신을 관찰하며 신속히 의료진에게 연락
3. 출혈 및 외상시 상처부위를 지압(냉찜질)후 의료진에게 연락
4. 쇼크시 활력증후 체크를
 - 1) 저혈당이면 의식이 있을시 사탕이나 설탕물을 공급하고 의식이 없을시 신속히 의료진에게 연락한다.
 - 2) 기립성 저혈압시 상체를 낮추고 다리를 올린다.

III. 기도폐쇄 일 경우

1. 음식 섭취시 질식 상태가 되면 입안의 음식물을 빨리 꺼낸다.
2. 구개반사요법을 시행한다 - 설압자를 사용하여 구도를 유도한다.
3. 손바닥으로 어깨뼈 사이에 있는 등 부분을 세게 때려 이물질이 올라와 기침으로 뱉어 낼 수 있도록 한다.
4. 바로 흡인을 할 수 있는 장소로 옮긴다.
5. 호흡 곤란시 산소를 제공한다.

IV. 응급상황의 유형

1. 심근경색 및 협심증일 때

1) 증상

- (1) 갑작스럽게 짓누르고 조이는 것 같은 앞가슴 통증
- (2) 청색증, 오심, 식은땀, 호흡곤란, 불규칙한 맥박, 의식소실

2) 응급처치

- (1) 활력증후를 측정한다.
- (2) 좌위나 반좌위 자세로 유지한다.
- (3) 목이나 가슴, 허리를 조이는 옷을 풀어준다.
- (4) 필요시 산소를 흡입 시킨다.
- (5) 금식 시킨다.
- (6) 니트로글리세린 응급약을 혀 밑에 넣어준다.
- (7) 필요시 병원으로 옮긴다.

2. 저혈당 쇼크시

1) 증상 - 식은땀, 어지러움, 헛기침, 실신, 의식장애, 기력저하

2) 응급처치

- (1) 활력증후 및 혈당을 체크한다.

(2) 저혈당 쇼크가 왔을 때

- * 의식이 있을 경우 : 적합한 음식과 양은 음료수(사이다, 콜라)1/2잔, 우유 1잔, 주스(가당)1/2잔, 요구르트1병, 설탕1큰술, 사탕3~4개, 초콜렛3쪽, 꿀 1큰술을 제공한다.
- * 의식이 없을 경우 : 음식물 섭취를 금하고 의료진에게 연락을 한다.

3. 고혈압으로 인한 응급상황

1) 증상 - 두통, 어지러움 등

2) 응급처치

- (1) 활력증후 측정
- (2) 의식이 없을 시 아무것도 먹거나 마시지 않도록 한다.
- (3) 혈압이 160/90 이상 시 누워서 머리를 올리는 자세로 안정을 취한다.
- (4) 필요시 병원으로 이송한다.

4. 경련으로 인한 응급상황

- 1) 경련의 양상을 관찰한다.
- 2) 끼는 벨트나 단추 등을 풀어준다.
- 3) 주변의 위험한 물건을 치운다.
- 4) 질식예방을 위해 기도를 확보하도록 한다.
- 5) 필요시 병원으로 이송한다.

5. 출혈로 인한 응급상황

- 1) 출혈시 부위를 지압한다.
- 2) 활력증후를 측정한다.
- 3) 출혈 부위는 심장보다 높게 유지한다.
- 4) 지압시 냉습포를 대어준다.
- 5) 필요시 병원으로 이송한다.

6. 기립성 저혈압일 때

- 1) 증상
 - (1) 현기증이나 두통, 사지가 차갑고 무기력함.
 - (2) 식은땀, 안명 창백
 - (3) 불면증상과 서맥(맥박이 서서히 뛰는 것)
 - (4) 구역질, 실신 등의 증상
- 2) 응급처치
 - (1) 머리는 낮추고 다리를 올리는 자세로 휴식을 취한다.
 - (2) 의식 저하시는 바로 의료팀에게 연락한다.
 - (3) 필요시 병원으로 이송한다.

7. 코피가 멈추지 않을 때

- 1) 콧바울 위로 지압을 한다.
- 2) ICE Bag을 대주기와 때기를 반복한다.
- 3) 10분간 압박해보고 코피가 계속 나면 다시 반복한다.
- 4) 필요시 병원으로 옮긴다.

8. 호흡곤란일 때

- 1) 산소를 제공할 수 있는 곳으로 옮긴다.
- 2) 자세를 반좌위나 좌위로 취한다.
- 3) 심리적 안정을 위하여 주위를 편안하게 해준다.
- 4) 필요시 병원으로 이송한다.

9. 화상으로 인한 응급상황

- 1) 화상, 부위의 깊이, 넓이를 확인한다.
- 2) 찬물에(5~12도) 15회 이상 씻어주며 열기를 식혀준다.
- 3) 흐르는 물에 직접 닿게 되면 수압으로 인해 피부 손상을 입게 되므로 주의한다.
- 4) 화상부위의 옷은 잡아당기거나 벗기지 말고 잘라내며 장신구는 빨리 제거 하도록 한다.

10. 뇌졸중으로 인한 응급상황

- 1) 증상
 - (1) 갑작스럽고 심한 두통, 심한구토
 - (2) 의식소실
 - (3) 입가가 밑으로 처지고 침을 흘리며, 말을 더듬거나 발음이 어눌해짐
 - (4) 마비현상
 - (5) 의식소멸
- 2) 응급처치
 - (1) 활력증후를 측정한다.
 - (2) 상체를 높이고 다리를 낮춘다.
 - (3) 기도폐쇄를 예방한다.
 - (4) 목이나 가슴을 조이는 옷은 풀어 순환과 호흡을 원활하게 한다.
 - (5) 금식시킨다.