


응급상황시대처요령



응급상황시대처요령

1 응급상황인지 아닌지 확인한다.



2 무엇을 할 것인지 알아본다.

누군가를 도와주기 위해서는 사람을 생각하는 자세, 응급상황에 대한 대처능력, 응급상황이 무엇인지를 아는 것 등이 필요하며 이러한 태도는 여러 가지 요소에 의해 형성되고 많은 시간이 필요하다.

- 먼저 환자의 상태를 판단해야 합니다.
- 환자의 상태가 위급하다고 생각되면 119번으로 전화를 걸어 구급차를 요청합니다.



3 구급차를 부른다

응급상황시 사람들은 당황한 나머지 구급차를 불러야 할 적절한 시점을 놓치는 경우가 있다.구조요청을 하지 않은 채 일반차량으로 환자를 병원으로 이송하는 경우 환자에게 심각한 위험을 초래할 수 있음을 알아야 한다.



4 안전한 장소에 환자를 옮긴다.



5 환자를 평가한다.

환자에 대한 평가는 먼저 생명이 위급한 상황인지를 파악하고 어떤 조치가 필요한지를 즉시 결정하여야 한다.



6 응급처치를 실시한다.

대부분의 생명구조 활동은 가장 가까이에 있던 사람이 응급조치를 취했을 경우에 효과가 크다. 즉 주위에 있는 사람의 즉각적인 응급조치가 가장 바람직하다.


기본인명구조술

1. 기본개념

호흡이 정지되거나 심장이 멈추게 되면 4-6분 이내에 심폐소생술이 시행되지 않으면 환자는 생존의 가능성이 낮다.구급차가 환자에게 도착하기까지 적어도 4-5분 이상 소요되므로 일반인들도 심폐소생술을 시행할 수 있어야 한다.환자의 연령이 9세 이상이거나 체중이 30kg 이상인 경우에는 아래의 심폐소생술의 단계에 따라 심폐소생술을 시행하지만,

※ 8세 이하의 어린이의 경우에는 성인의 심폐소생술 시행 방법과는 차이가 있다.

일반적인 심폐소생술의 주요 단계별 처치



2. 기도유지

사람이 의식이 없을 때 가장 흔한 기도폐쇄의 원인은 혀가 뒤로 말려서 기도를 막는 경우이다. 막힌 기도를 열기 위해서는 기도를 유지시켜야 한다.

두부후굴 하악거상법

1. 환자의 머리쪽에 있는 처치자는 환자의 이마에 손바닥을 얹고 머리를 뒤로 젖혀준다.
2. 다른 손의 손가락을 환자의 아래턱뼈 밑에 대고 끌어올린다.
3. 턱 선과 바닥면이 수직이 되도록 한다
4. 턱밑에 손가락을 댈 때 연한 조직을 누르면 기도가 막힐 수도 있으므로 주의한다.

