

안전한 코로나19 예방접종을 위해

예방접종 후 이상반응에 대한 안내사항 꼭 기억해 주세요!



예방접종 후 이렇게 하시면 도움이 됩니다.



접종부위 부기, 통증이 있는 경우

깨끗한 마른 수건을 대고 그 위에 **냉찜질** 하세요.



미열이 있는 경우

수분을 충분히 섭취하고 휴식을 취하세요.



발열이나 근육통 등으로 불편함이 있는 경우

해열·진통제를 복용하시면 도움이 됩니다.

* 예방접종 전에 미리 아세트아미노펜 성분의 해열·진통제를 준비하고,
예방접종 후 몸살 증상이 있으면 해열·진통제를 복용하세요.

다음과 같은 경우에는 의사의 진료를 받으세요.


예방접종 후

- 발열, 몸살, 두통 등의 증상이 2일 이상 지속되는 경우
- 발열, 몸살, 두통 증상이 해열·진통제를 복용해도 호전되지 않거나 악화되는 경우
- 갑자기 기운이 떨어지거나 평소와 다른 이상 증상이 나타난 경우
- 접종부위가 아닌 곳에서 멍이나 출혈이 생긴 경우



다음과 같은 경우에는 119에 신고하거나 응급실을 방문하세요.

- 예방접종 후 숨쉬기 곤란하거나 심하게 어지러운 경우
- 예방접종 후 입술, 얼굴이 붓거나
온몸에 심한 두드러기 증상이 나타나는 경우
- 예방접종 후 갑자기 의식이 없거나 쓰러진 경우



#우리 함께 일상으로

코로나19 예방접종

안전하고 신속하게
진행하겠습니다

